

Raskaana olevien hinkuyskärökotukset

THL suosittaa raskaana oleville hinkuyskärökotetta. Keväästä 2024 alkaen Suomessa on raportoitu tavanomaista enemmän hinkuyskätartuntoja. Erityisen riskiryhmän muodostavat alle kolmen kuukauden ikäiset lapset, jotka eivät ole vielä ehtineet saada ensimmäistä hinkuyskärökoteannosta. Vastasyntynyttä lasta voi suojella myös äidin raskauden aikaisella rokotteella. Käytettävä rokote on kauppanimeltään Triaxis.

Hinkuyskärökotusten kohderyhmiin kuuluvat kaikki Suomessa raskaana olevat.

Hinkuyskärökotteen tehosteannos suositellaan annettavan raskausviikoilla 16–32, jolloin hinkuyskän vasta-aineet siirtyvät sikiöön ja antavat vastasyntyneelle suojan hinkuyskää vastaan. Rokotteen voi tarvittaessa antaa myös raskausviikon 32 jälkeen.

- Jos raskaana olevalla on varattu aika neuvolaan raskausviikoille 16–32, ei rökotukseen varata erillistä neuvolakäyntiä.
- Mikäli raskaana olevalla ei ole suunniteltu neuvolakäyntiä ennen raskausviikkoa 32 tai raskaus on jo pidemmällä, voi rökotuksen hakea myös Keusoten neuvoloiden avoneuvoloista.

Suosittelemme raskaana oleville hinkuyskärökoteannosta jokaisessa raskaudessa riippumatta siitä, milloin edellinen hinkuyskä – tai jäykkäkouristusrokote on annettu. Jos äiti on raskauden aikana saanut hinkuyskärökotuksen, ei toista rökotusta saman raskauden aikana tarvita.

<https://thl.fi/-/thl-suosittelee-hinkuyskarokotetta-raskaana-oleville-syyna-tana-vuonna-lisaantyneet-tautitapaukset-jotka-voivat-olla-vaarallisia-vauvoille>